

Info



Isokirvavainokainen

Aphidius colemani

Kirvojen torjuntaan

Käytetään mm. kurkku- ja persikkakirvan torjuntaan.

Toimintaperiaate

Toimitetaan "muumiona". Kuoriutuva aikuinen etsii kasvustosta kirvoja, joihin se munii (eli loisii). Myöhemmin loisittu kirva muuttuu "muumioksi".

Käyttö

Voidaan levittää BioBoxien avulla, tai **kuivaan kohtaan** kasvin tyvelle tai kasvualustan päälle. Yhdestä purkista riittää useampaan levityspisteeseen. Myös kyljelleen käännetty purkki käy levitykseen. Huom. ei yli 1 cm paksuista kantoainekerrosta.

Levitysmäärä

Ennakkotorjunta: 0,5–1 kpl/m², joka toinen viikko.
Lievä/paha saastunta: 2–10 kpl/m², viikoittain.
Lisäksi esim. kirvasääskiä, harsokorentotoukkia tai muita kirvapetoja.

Pakkauskoot

500 kpl, 10 000 kpl

Kantoaine

Tattarinkuori

Parasitstekel

Aphidius colemani

Bekämpning mot bladlöss

Används bl.a. för bekämpning av gurk- och persikbladlus.

Verksamhetsprincip

Levereras som en "mumie". Den kläckande vuxen söker bladlöss på växten som den lägger sina ägg i (d.v.s. parasiterar dem). Senare förvandlas den parasiterade bladlössen kommer att bli "mumie".

Bruksanvisningar

Utsätt i små högar som får **inte bli våta** på växtunderlaget eller BioBoxar, eller lämna burkar öppna hängande från växer om detta är applicerings sättet. Låga högar så att insekter kan kläckas och komma ut från högan (max 1 cm).

Utspridning

Förebyggande bekämpning: 0,5–1 st/m², varannan vecka.
Lindrigt/svårt angrepp: 2–10 st/m², varje vecka.
Dessutom bladlusgallmyggor, guldögonslända larv, eller andra nyttodjur mot bladlöss

Förpackning

500 st, 10 000 st

Bärande medel

Boveteskal

Parasitic wasp

Aphidius colemani

Against aphids

Specially used against *Aphis gossypii* and *Myzus persicae*.

Mode of action

Aphidius colemani are delivered as "mummies". Adult parasitic wasps emerge from these mummies and seek for aphids, which they parasitize. Later these aphids turn into "mummies".

Instruction for use

Place the mummies + carrier material in BioBoxes or in a **dry** place at the base of the plant / on the growing medium. You can even use the small cardboard tube where *A. colemani* is delivered in (make several application points from tube). Make sure that the carrier layer is not more than 1 cm thick.

Application rate

Preventative control: 0,5–1 pcs/m², every second week.
Curative control: 2–10 pcs/m², weekly.
Use also some aphid predators (aphid midge, lacewing larvae or ladybeetles).

Pack size

500 pcs, 10 000 pcs

Carrier material

Buckwheat hulls