

Prestop®

För bekämpning av rotsjukdomar hos jordgubbe på friland, i tunnel och i växthus

Prestop® är ett biologiskt växtskyddsmedel som innehåller svampen *Gliocladium catenulatum* J1446 som har isolerats ur finländsk åkerjord. Prestop bekämpar svampsjukdomar effektivt och mångsidigt i såväl växtunderlaget som bladverket. Rotsjukdomar hos jordgubbe (*Phytophthora*, *Pythium*, *Fusarium*) försämrar plantornas tillväxtstart, minskar skördemängden och orsakar plantdöd. De problem som rotsjukdomarna orsakar kan motverkas redan i förväg genom att man behandlar plantorna med Prestop i planteringsstadiet. Plantor som behandlats med Prestop har starka rötter, övervintrar säkrare och ger en tidigare och rikligare skörd. Prestop lämpar sig också för ekologisk odling.



Behandla jordgubbsplantorna i samband med planteringen och upprepa vid behov behandlingen efter 1 månad (Minor Use -användningstillstånd):

Dopningsbehandling: Doppa plantorna i 0,5 % Prestop -vattenblandning så att rötterna blir helt genomfuktade. En snabb dopning räcker. För att doppa 30 000 - 40 000 plantor går det åt cirka 400 liter 0,5 % vattenblandning.

Bevattningsbehandling av pluggplantor och potplantor: Bevattna före planteringen med 0,5 % Prestop-vattenblandning 25 l/1000 plantor (125 g/1000 plantor).

Radbekämpning, radbevattningsbehandling eller droppbevattningsbehandling: Använd 200-250 g Prestop/1000 plantor. Bevattna eller bespruta på rotzonen med t.ex. 0,5 % vattenblandning eller behandla plantorna via droppbevattningsbehandling.

Gör Prestop-vattenblandningen så här: Blanda Prestop-pulvret till först i en liten mängd kallt vatten (1 kg/10-20 liter) och låt blandningen stå i 15-30 minuter. Rör om vattenblandningen omsorgsfullt tills allt pulver har löst sig och späda ut till den slutliga brukskoncentrationen. 0,5 % Prestop-vattenblandning: 1 kg Prestop-pulver/200 liter vatten.


Prestop finns att få i förpackningar om 100 g och 1 kg. Produkten är hållbar 12 månader i oöppnad förpackning om den förvaras svalt, under +8° C.



Prestop dopningsbehandling i planteringskedet och bevattning 250 g/1000 plantor cirka 1 månad efter planteringen

Obehandlad kontroll

Andelen döda plantor (%) (Polka)



Prestopbehandlingar (dopning och bevattning) som gjordes föregående växtperiod minskade plantdödligheten hos jordgubbe under vintern i tunnel och på friland.